

Dấu hiệu của sót thai sau khi uống thuốc phá thai ở sản phụ
Triệu chứng sót nhau khi uống thuốc phá thai gây nên tình trạng chảy máu dây dưa, kéo dài gây ra bội nhiễm, mất máu. Tình trạng này cần được chữa trị sớm để hạn chế các nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe, chức năng sinh nở trong thời gian sắp tới.

Phái nữ sau thời điểm tiến hành uống thuốc phá thai bắt buộc phải khám lại để chắc chắn đã sạch thai tuyệt đối trong lòng tử cung. Việc chớ nên nhận biết sớm & chữa ngay từ giai đoạn đầu hiện trạng sót nhau sẽ gây nhiều di chứng tác hại như: bội nhiễm huyết & viêm nhiễm tiểu khung.



Triệu chứng của sót thai sau khi phá thai bằng thuốc ở nữ giới

Sau khi phá thai nội khoa, một số nữ giới sẽ có triệu chứng xung huyết trong thời kỳ 10 - 2 tuần. Trong trường hợp ở khoảng thời gian này, phụ nữ mang thai gặp một số triệu chứng sau đây thì vô cùng có thể là biểu hiện dây rốn còn sót.

- Bụng đau dữ dội

Sau thời điểm uống thuốc đình chỉ thai kỳ, dạ con của người phụ nữ sẽ bị xúc tác & thực hiện co bóp để tống xuất thai ra ngoài. Việc đó sẽ khiến mẹ bầu gặp một vài đau rất tương đối giống với đau bụng kinh với có cảm giác đau râm râm, râm râm ở khu vực bụng dưới. Hiện tượng này sẽ trong thời gian ngắn hết trong 1 - Bốn mươi tám giờ, phái đẹp sẽ không cảm thấy đau bụng nữa khi túi thai ra hết.

Tuy vậy, chị em cũng cần chú ý nếu như một số đau đớn ở vùng bụng trở nên lâu ngày, dữ dội liên tiếp thì đây là một trong số các biểu hiện bội nhiễm do sót nhau sau thời điểm uống thuốc phá thai.

- Chảy máu âm đạo kéo dài

Chảy máu lạ thường có thể là triệu chứng sót nhau khi phá thai nội khoa. Tùy cơ địa từng người, bạn sẽ bị ra máu âm đạo trong 7 - 10 ngày sau khi uống thuốc nạo phá thai. Trong một số ngày đầu còn xuất hiện cả khối máu đông tiếp đó lượng máu giảm dần. Chính vì, trong trường hợp hiện tượng chảy máu âm đạo bất thường kéo dài thời gian lâu dài & không có dấu hiệu giảm dần thì rất có thể bạn nguy cơ bị sót nhau sau khi phá thai nội khoa.

Dấu hiệu chảy máu kéo dài nếu như không được xử lý kịp thời sẽ dễ dẫn đến viêm nhiễm, bội nhiễm, băng huyết cực kỳ nguy hại. Có thể còn, máu chảy tương đối nhiều còn khiến người mẹ bị mất máu và mắc phải tình trạng choáng ngất, chóng mặt... có khi còn tác hại đến mạng sống nếu không kịp thời cấp cứu ngay.

- Kinh nguyệt khác thường

Máu kinh bất thường cũng là một biểu hiện sót nhau khi phá thai bằng thuốc cần được lưu ý. Sốt dây rốn sẽ khiến kinh nguyệt lần đầu tiên sau thời điểm đình chỉ thai nghén ra nhiều & có cả một số huyết khối. Ngoài ra máu kinh của người mắc bệnh cũng có mùi tanh nồng hơn bình thường.

- Phụ nữ cảm giác mệt mỏi & sốt

Thuốc phá thai gây ảnh hưởng mạnh đến dạ con khiến thai phụ có thể bị sốt nhẹ, cảm giác mệt mỏi. Tuy nhiên hiện trạng này thường chỉ lâu ngày 1 - 48h rồi hết. Nếu như sau thời điểm phá thai bằng thuốc, sau thời kỳ trên bạn vẫn bị thân nhiệt cao, cơ thể cảm nhận mệt mỏi, ớn lạnh, thân thể thiếu nhựa sống, kiệt lực gây ra mê sảng thì đây là dấu hiệu sót nhau thai.

Chưa kể đến, sót nhau sau khi uống thuốc phá thai cũng có thể nhìn thấy một vài biểu hiện như: sưng phình ở hạ vị, choáng ngất, dịch tiết âm đạo có mùi khó chịu, viêm phụ khoa, bội nhiễm.

Nguyên nhân sót nhau sau khi sử dụng thuốc kết thúc thai kỳ

Phá thai bằng thuốc là giải pháp nạo phá thai vô cùng dễ ứng dụng tuy nhiên lại có hoàn cảnh ngặt nghèo về sức khỏe cơ thể phụ nữ có bầu cũng như thai nghén. Bởi vậy trước khi cho dùng thuốc bác sỹ phải xét nghiệm cực kỳ kỹ để giảm thiểu nguy cơ khi thực hiện đình chỉ thai kỳ. Sau đây là những nguyên do gây ra tình trạng sốt thai sau thời điểm uống thuốc phá thai:

- Bào thai lớn hơn 7 tuần tuổi.
- Thai nghén nằm ngoài tử cung hoặc chưa di chuyển vào trong dạ con.
- Sức khỏe thai phụ không tốt, gặp phải những bệnh như: Tim mạch, huyết áp cao, rối loạn đông máu, suy gan thận... hoặc bị dị ứng với đối tượng thuốc kết thúc thai kỳ.
- Sử dụng thuốc phá thai chất lượng không bảo đảm.
- Dùng sai lầm thuốc để đình chỉ thai kỳ.
- Tiến hành phá thai nội khoa sai lầm theo phác đồ chuẩn.
- Những trường hợp tùy tiện sử dụng thuốc phá thai ngay tại nhà hay tại những trung tâm chăm sóc sức khỏe kém chất lượng, siêu âm sai lầm tuổi thai... cực kỳ dễ dẫn tới rủi ro sốt nhau sau khi phá thai bằng thuốc.

Sốt thai sau khi phá thai nội khoa có sao không?

Các bạn có thể khẳng định rằng không gì nguy hiểm hơn phụ nữ mang thai nạo phá thai mà lại sốt nhau. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cơ thể của chị em hiện tại & cả về sau này. Chi tiết:

- Hiện tượng sốt nhau thai khiến bà bầu thân nhiệt cao, đau bụng dữ dội, cảm thấy mệt mỏi đến kiệt lực. Việc này ảnh hưởng lớn đến công việc & sinh hoạt hàng ngày của các phái nữ sau khi phá thai nội khoa.
- Xung huyết lâu ngày dễ gây ra hiện tượng xuất huyết ở tử cung rất nguy hiểm cho tính mạng. Có những trường hợp trầm trọng bác sỹ có thể phải cắt bỏ tử cung có nghĩa là với việc bạn không còn cơ hội làm mẹ.
- Viêm nhiễm từ dây rốn có thể lan đến các cơ quan sâu phía trong gây nên viêm buồng trứng, tắc vòi trứng khiến thụ thai khó có thể còn là vô sinh.
- Xuất huyết âm đạo nhiều ngày khiến vùng bẹn ẩm thấp thường xuyên khiến bạn dễ mắc những bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

- Nhiễm trùng ổ bụng có thể tác động vào máu gây nên bội nhiễm huyết cục kì nguy hại.
- Rủi ro dị tật bẩm sinh thai nhi cao trong trường hợp bỏ thai không thành công.

Phương pháp chữa sót thai sau khi phá thai bằng thuốc

Phụ nữ ngay khi nhận biết thân thể một số triệu chứng bất thường nghi ngờ sót nhau sau thời điểm phá thai bằng thuốc, phụ nữ có bầu nên đến ngay các trung tâm y tế chuyên khoa. Ở đây bác sĩ chuyên khoa sẽ siêu âm để định vị nguyên nhân và trạng thái cụ thể. Tiếp đó tiến hành các giải pháp loại đình chỉ thai nghén còn sót, làm sạch máu và dịch trong tử cung. Cách quen thuộc được ứng dụng là hút thai nhưng có nhiều trường hợp chỉ cần uống thuốc.

Chọn ra bệnh viện & cơ sở y học uy tín ở bước này càng cấp bách hơn. Việc hút thai trong hoàn cảnh y tế không bảo đảm có thể gây nên viêm nhiễm & gây nên vết thương dạ con.

Hiện trạng sót dây rốn sau khi uống thuốc phá thai khá quen thuộc. Trong trường hợp không nên cấp cứu, xử trí ngay từ giai đoạn đầu sẽ gây nên những biến chứng đáng tiếc, tổn thương đến khả năng sinh sản, có khi còn là tính mạng của phụ nữ có bầu. Do đó, nếu như thấy thân thể mình xuất hiện những biểu hiện sót nhau khi phá thai nội khoa vừa rồi thì cần phải trong thời gian ngắn đi đến bác sĩ khám để nhận được giải đáp, khám bệnh, hỗ trợ từ thầy thuốc.

Địa chỉ phá thai ở hà nội <https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Phòng khám đa khoa ở Hà Nội <https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi>

Chi phí phá thai an toàn <https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

phathaithaiha.webflow.io

Benh vien Thai Ha <https://phathaithaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>